

COMPLICACIONES

Pueden ser:

- *Salida de una de las dos barritas.
- *Sangrado del sitio de la inserción.
- *Infección de la herida.
- *Fiebre.


¿QUIÉNES PUEDEN USARLO?

- *Mujeres con o sin hijos en cualquier edad reproductiva.
- *Mujeres en post parto inmediato que no estén amamantando; o que estén amamantando –después de las seis semanas post parto–.
- *Mujeres con presión arterial alta.
- *Mujeres que no puedan o no quieran usar estrógenos.
- *Mujeres que quieran una protección altamente eficaz y de larga duración.

PASMO

también se une a los esfuerzos en materia de planificación familiar con un programa destinado a mujeres en edad reproductiva de bajos recursos económicos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

¿QUÉ ES EL IMPLANTE ?



PIENSA

VIVE

PASMO

PLANIFICA

Estimada Usuaría:
Esta información será para usted de mucha utilidad, le sugerimos que la lea detenidamente y la guarde para cualquier información.

¿QUÉ ES EL IMPLANTE SUBDÉRMICO?

Es un anticonceptivo que



se inserta en el brazo

y que puede durar hasta **7 años**.

Al cumplir este tiempo el implante puede ser reemplazado

si la **USUARIA** lo desea.



CUIDADOS DESPUÉS DE LA INSERCIÓN



*Mantenga seca el área de la inserción.

*Deje el vendaje de presión durante 48 horas, luego retire el vendaje y lave corrientemente.

48
horas

*Evite cargar cosas pesadas.



*Reinicie sus relaciones 3 días después de la inserción, en caso de reiniciarlas antes, utilice condón.

...CUIDADOS DESPUÉS DE LA INSERCIÓN



*Puede retornar inmediatamente a su trabajo.

*No se preocupe si aparecen dolor leve, moretones o hinchazón leve, son síntomas normales.

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos ocurren rara vez, entre estos están:

*Leve manchado de sangre entre menstruación y menstruación.

*Aumento del sangrado menstrual en días y cantidad.

*Ausencia de menstruación.